



سوالات شبه نهایی درس: ریاضیات گستره	بسمه تعالی	تاریخ امتحان: ۱۴۰۲۰/۱/۲۹
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه رشته ریاضی فیزیک	آموزش و پرورش استان کرمانشاه	زمان امتحان: ۱۲۰ دقیقه
نام و نام خانوادگی:	مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی	تعداد صفحات: ۲ صفحه
دانش آموزان سراسر استان در فروردین ۱۴۰۲	(نوبت عصر)	تعداد سوالات: ۱۷

امام علی (ع) فرمود: کسی که با دانش خود به پیکار با جهل خویش برخیزد، به بالاترین خوشبختی می‌رسد.

ردیف	منتن سوالات صفحه‌ی اول	بارم
۱	<p>درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را مشخص کنید.</p> <p>الف) برای هر دو عدد حقیقی <math>x</math> و <math>y</math> داریم <math>\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{x+y}</math>.</p> <p>ب) گراف <math>P_7</math> دارای دوری به طول ۷ است.</p> <p>ب) مرتبه هر گراف نشان‌دهنده تعداد یال‌های آن گراف است.</p> <p>ت) با ارقام ۳، ۴، ۵، ۶ می‌توان ۱۲ عدد دو رقمی متمایز نوشت.</p>	۱
۲	<p>جهای خالی را کامل کنید.</p> <p>الف) معادله همنهشتی <math>ax^m \equiv b</math> دارای جواب است اگر و تنها اگر .....</p> <p>ب) تعداد یال‌های گراف <math>K_7</math> برابر است با .....</p> <p>ت) دو یال را ..... می‌نامیم، هرگاه رأسی وجود داشته باشد که هر دوی آنها را به هم متصل کند.</p> <p>پ) ۵ توب یکسان را بین ۳ نفر بصورت دلخواه به ..... طریق می‌توان توزیع کرد.</p>	۱
۳	<p>اگر <math>\alpha, \beta</math> دو عدد گنگ باشند ولی <math>\alpha + \beta</math> گویا باشد. ثابت کنید <math>\alpha - \beta</math> گنگ است.</p>	۱/۲۵
۴	<p>اگر باقی‌مانده تقسیم عدد <math>a</math> بر اعداد ۷ و ۸ بترتیب برابر ۵ و ۷ باشد، باقی‌مانده تقسیم عدد <math>a</math> را برابر ۵۶ بیابید.</p>	۱
۵	<p>معادله همنهشتی <math>423x \equiv 79</math> به پیمانه‌ی ۱۱ را حل کرده و جواب عمومی آن را بیابید.</p>	۱/۲۵
۶	<p>اگر ۲۹ خرداد یک سال دوشنیه باشد. ۲ اسفندماه در همان سال چه روزی از هفته است؟</p>	۱
۷	<p>گراف <math>G</math> به صورت رو به رو رسم شده است.</p> <p>الف) <math>(G), \Delta(G)</math> و <math>\delta(G)</math> را مشخص کنید.</p> <p>ب) بیشترین درجه در مکمل گراف <math>G</math> چند است و مربوط به کدام رأس است؟</p> <p>پ) <math>N_G(e)</math> را با اعضا بنویسید.</p> <p>ت) آیا گراف <math>G</math> همبند است؟</p>	۱/۷۵
۸	<p>در گراف <math>G</math> با مجموعه رأس‌های <math>V = \{a, b, c, d, e, f\}</math> داریم:</p> <p><math>N_G(a) = \{b, c, d\}</math> ، <math>N_G(e) = \{b, f\}</math> ، <math>N_G(f) = \{c, d\}</math></p> <p>الف) نمودار گراف را رسم کنید.</p> <p>ب) یک مسیر به طول ۴ از <math>a</math> به <math>b</math> بنویسید.</p> <p>پ) یک دور به طول ۵ بنویسید.</p>	۱
۹	<p>گراف کامل <math>K_p</math> دارای ۱۰ یال است. ابتدا <math>P</math> را بیابید سپس گراف را رسم کنید.</p>	۱

ردیف	متن سوالات صفحه‌ی دوم	بارم
۱۰	تفاوت بین مجموعه‌ی احاطه‌گر مینیمال و مجموعه‌ی احاطه‌گر مینیمم چیست؟	۱
۱۱	عدد احاطه‌گری گراف شکل مقابل را با ارائه راه حل، تعیین کنید.	۱/۲۵
۱۲	۵ کتاب ریاضی و ۴ کتاب فلسفه به چند طریق می‌توانند کنار هم قرار بگیرند اگر بخواهیم: الف) همواره کتاب‌های ریاضی کنار هم باشند. ب) کتاب‌های ریاضی و فلسفه به صورت یک در میان قرار بگیرند. پ) کتاب‌های ریاضی کنار هم و کتاب‌های فلسفه کنار هم باشند.	۱/۵
۱۳	۷ نفر به چند طریق می‌تواند در یک اتاق سه نفره و دو اتاق دو نفره قرار بگیرند؟	۰/۵
۱۴	معادله $x_۱ + x_۲ + x_۳ + x_۴ + x_۵ + x_۶ = ۱۲$ چند جواب صحیح نامنفی دارد به شرطی که $x_۷ > ۲$ باشد؟	۱/۵
۱۵	در مربع لاتین زیر سطر اول و سطر سوم مربع را جابه‌جا کنید و مربع حاصل را A بنامید. سپس ستون دوم و ستون سوم مربع A را جابه‌جا کنید و مربع حاصل را B بنامید. آیا B و A متعامدند؟ (با ذکر دلیل)	۲
۱۶	به چند طریق می‌توان ۵ شاخه گل را بین ۳ نفر توزیع کرد به شرط آنکه هر نفر حداقل یک شاخه گل داده باشیم؟	۱
۱۷	حداقل چند نقطه داخل یک مثلث متساوی‌الاضلاع به طول ضلع ۲، انتخاب کنم تا اطمینان داشته باشیم که حداقل ۲ نقطه از آنها فاصله‌شان کمتر از یک است؟	۱
	سربرلندي شما آرزوی ماست.	جمع بارم
		۲۰

راهنمای تصویب امتحان شبه نهایی درس: گستره		
تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۰۱/۲۹	بسمه تعالی	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
زمان امتحان: ۱۲۰ دقیقه	آموزش و پرورش استان کرمانشاه	نام و نام خانوادگی:
تعداد صفحات: ۲ صفحه	مرکز سنچش و پایش کیفیت آموزشی	دانش آموزان سراسر استان در فروردین ۱۴۰۲
تعداد سوالات: ۱۷	(نویت حصر)	(نویت حصر)
پاره	پاسخ سوالات صفحه اول	ردیف
۱	(۰/۲۵) ت) درست (۰/۲۵) ب) نادرست (۰/۲۵) (۰/۲۵) ب) نادرست (۰/۲۵) (۰/۲۵) ب) نادرست (۰/۲۵)	۱
۱	(۰/۲۵) ۲۱(ت) (۰/۲۵) ب) مجاور (۰/۲۵) (۰/۲۵) ۲۱(ب) (۰/۲۵) (۰/۲۵) ب) (a, m) b	۲
۱/۲۵	$\alpha - \beta = m \in Q$ (۰/۲۵), $\alpha + \beta = n \in Q$ (۰/۲۵) $\rightarrow \alpha = \frac{m+n}{2} \in Q$ (۰/۲۵) که با مینگ بودن $\alpha$ در تناقض است. (۰/۲۵) (تمرین ۳ ص ۸)	۳
۱	$a = 7k + 5$ , $a = 8k + 7 \rightarrow 8a - 7a = (56k + 40) - (56k + 49)$ $a = 56k - 56k - 9 \rightarrow a = 56k - 56k - 56 + 47 = 56q + 47$ $r = 47$ (۰/۲۵) (تمرین ۹ صفحه ۱۶)	۴
۱/۲۵	$423_{\equiv 5}^{11}$ , $79_{\equiv 2}^{11}$ (۰/۲۵) $\Rightarrow 5x_{\equiv 2}^{11}$ (۰/۲۵) $5x_{\equiv 2}^{11} + 3 \times 11 = 35$ (۰/۲۵) $x_{\equiv 7}^{11}$ (۰/۲۵) $\Rightarrow x = 11k + 7$ $k \in \mathbb{Z}$ (۰/۲۵) (تمرین ۱۴ صفحه ۳۰)	۵
۱	طبق جدول روزشمار ۲ اسفند روز دوم یعنی چهارشنبه است. (۰/۲۵) (مشابه تمرین ۱۵ صفحه ۳۰) $2 + 5 \times 30 + 3 \times 31 + 2 = 247$ (۰/۵) $247_{\equiv 2}^{11}$ (۰/۲۵)	۶
۱/۷۵	(۰/۲۵) راس f بیشترین درجه را دارد. (۳۹ تا ۳۳) (۰/۲۵) (ت) خیر (۰/۲۵) (۰/۵) $N_G(e) = \{b, c\}$ (۰/۵)	۷
۱	الف) رسم (۰/۵) (مفاهیم اساسی گراف صفحه ۳۳) (۳۹ تا ۳۳)  (۰/۲۵) adfeb (۰/۲۵) acfeba یا adfeba (۰/۲۵) دور به طول ۴	۸
۱	(۰/۲۵) $\frac{p(p-1)}{2} = 10 \times (10/25) \Rightarrow p^2 - p - 10 = 0 \Rightarrow p = 5 \times (10/25)$ رسم گراف (۰/۲۵) 	۹
۱	مجموعه احاطه‌گر مینیمم مجموعه احاطه‌گری است که کمترین تعداد عضو را دارد ولی مجموعه احاطه‌گر مینیمال مجموعه احاطه‌گری است که با حذف هر یک از وتوس آن دیگر احاطه‌گر نیست و می‌تواند از مجموعه احاطه‌گر مینیمم بیشتر عضو داشته باشد. هر مورد (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵)	۱۰
۱/۲۵	لذا حداقل عدد احاطه‌گری ۲ است. (۰/۵) از طرفی $\{e, f\}$ یک مجموعه احاطه‌گر است. (۰/۵). پس $\leq 2 \gamma(G) \leq 2$ در نتیجه $\gamma(G) = 2$ (عدد احاطه‌گری). (۰/۵) (۰/۵) (۰/۵) (۰/۵) (۰/۵)	۱۱
۱/۵	الف) $5! \times 5!$ (۰/۵) (۰/۵) ۵! $\times 4! \times 2$ (۰/۵) (۰/۵) ۵! $\times 4!$ (۰/۵) (۰/۵) (۰/۵) (۰/۵) (۰/۵)	۱۲

ردیف	متن سوالات صفحه دوم	بارم
۱۳	(تمرین ۷ صفحه ۷۱) $\frac{7!}{3! \times 2! \times 2!} \quad (0/5)$	۰/۵
۱۴	(تمرین ۹ صفحه ۷۱) $x_r = ۴, \quad x_d \geq ۳ \Rightarrow x_d = y_d + ۳ \quad (۰/۵)$ $x_۱ + x_r + ۴ + x_s + ۳ + y_d + x_s = ۱۲ \quad (۰/۲۵)$ $\Rightarrow x_۱ + x_r + x_s + y_d + x_s = ۱۲ \quad (۰/۲۵) \Rightarrow \mathcal{C} = \binom{۹}{۴} \quad (۰/۵)$	۱/۵
۱۵	مریع A به شکل زیر است. (0/75)  و مریع B به شکل زیر است. (0/75)  متقاعد هستند (0/25) زیرا در مریع پایین عدد دو رقمی تکراری نداریم (0/25)	۲
۱۶	(مثال صفحه ۷۷) $\frac{3^5}{(0/25)} - \left( \frac{3 \times 2^5}{(0/25)} - \frac{3}{(0/25)} \right) = \frac{150}{(0/25)}$	۱
۱۷	مانند شکل مقابل، مثلث مفروض را به چهار مثلث متساوی الاضلاع به ضلع ۱ تقسیم می کنیم (0/25) با انتخاب ۵ نقطه داخل مثلث طبق اصل لانه کوتوری حداقل یکی از مثلثها شامل دست کم دو نقطه از این ۵ نقطه خواهد بود (0/25) و فاصله این ۲ نقطه از طول ضلع مثلث های کوچکتر کمتر است (0/25) رسم شکل (0/25) (مثال صفحه ۸۰)	۱
	سریلندي شما آرزوی ماست	
	نام و نام خانوادگی مصحح: ..... تاریخ و امضاء: ..... نمره با حروف: ..... نمره با عدد: .....	جمع بارم نمره ۲۰